

1-COMPONENT AARDE VOEDING BUD-XL SUCCES SCHEMA



GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR HET AANMAKEN VAN EEN VOEDINGVAT

1. Korte groelfase / Lange groelfase / Bloei fase
2. Voedingsvat vullen met water van ± 20 graden Celsius
3. Toevoegen 1-Component basisvoeding
4. Zorg voor een goede circulatie
5. De EC waarden afstellen (zie weekschema)
6. Afstellen pH tussen de 6.5 - 7.0 (Optimaal 6.8)
7. Stimulatoren toevoegen (Wortel, Groei, Bloei)
8. Het voedingsvat is nu klaar voor gebruik

1-COMPONENT AARDE VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
	1.2 EC	1.3 EC	1.4 EC	1.5 EC	1.8 EC	2.0 EC	2.0 EC	2.0 EC	2.0 EC	2.0 EC
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	2.0 ML	2.5 ML	3.0 ML	3.5 ML	4.0 ML	5.0 ML	5.0 ML	5.0 ML	5.0 ML	5.0 ML

LET OP !!! De EC waarden kunnen per regio verschillen, meet de EC waarden en gebruik altijd de EC waarden van het schema als basiswaarden !!

LET OP !!! Hoe langer de groelperiode hoe groter uw planten stem de groelperiode af naar de hoogte van U ruimte.

ROOTS EXCELURATOR - WORTELSTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	0.3 ML	0.3 ML	0.3 ML	0.3 ML	0.3 ML					

MULTI ENZYM - GROEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:			1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML					

BUD-XL - BLOEISTIMULATOR FEED VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:						1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML

DRIPCLEAR - REINIGINGSMIDDEL VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML

TOPBOOSTER - BLOEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	4 weken voor de oogst
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	GEBRUIK 1.5 ML: 3- 4 dagen, 4 weken voor de oogst

SHOOTING POWDER - BLOEISTIMULATOR 1-2 SACHETS VOOR 1 VOEDINGSVAT VAN 100 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	3 weken voor de oogst
1 sachet	eerste week van de laatste 3 weken voor de oogst
2 sachets	laatste 2 weken van de laatste 3 weken voor de oogst

Niet gebruiken in een systeem zonder afwatering (drainage). Gebruik nooit een zuurstofpomp in het voedingsvat of op uw kweektafel

1-COMPONENT AARDE VOEDING DNA-CEL SUCCES SCHEMA



GEbruiksaanwijzingen voor het AANMAKEN VAN EEN VOEDINGVAT

1. Korte groeifase / Lange groeifase / Bloei fase
2. Voedingsvat vullen met water van ± 20 graden Celsius
3. Toevoegen 1-Component basisvoeding
4. Zorg voor een goede circulatie
5. De EC waarden afstellen (zie weekschema)
6. Afstellen pH tussen de 6.5 - 7.0 (Optimaal 6.8)
7. Stimulatoren toevoegen (Wortel, Groei, Bloei)
8. Het voedingsvat is nu klaar voor gebruik

1-COMPONENT AARDE VOEDING VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
	1.2 EC	1.3 EC	1.4 EC	1.5 EC	1.8 EC	2.0 EC	2.0 EC	2.0 EC	2.0 EC	2.0 EC
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	2.0 ML	2.5 ML	3.0 ML	3.5 ML	4.0 ML	5.0 ML	5.0 ML	5.0 ML	5.0 ML	5.0 ML

LET OP !!! De EC waarden kunnen per regio verschillen, meet de EC waarden en gebruik altijd de EC waarden van het schema als basiswaarden !!

LET OP !!! Hoe langer de groeiperiode hoe groter uw planten stem de groeiperiode af naar de hoogte van U ruimte.

DNA-CEL 1 - WORTELSTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML					

DNA-CEL 2 - GROEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:			1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML					

DNA-CEL 3 - BLOEISTIMULATOR FEED VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:						1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML	1.0 ML

DRIPCLEAR - REINIGINGSMIDDEL VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	WK 1	WK 2	WK 1	WK 2	WK 3	WK 4	WK 5	WK 6	WK 7	WK 8
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML	0.1 ML

TOPBOOSTER - BLOEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	4 weken voor de oogst									
Aan 1 Liter voedingwater toevoegen:	1.5 ML	gedurende 3-4 days				4 weken voor de oogst				

TOP SHOOTER - BLOEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

	3 weken voor de oogst									
0.7 ML toevoegen aan 1 liter voedingwater	eerste week van de laatste 3 weken voor de oogst					ATTENTIE: BASIS VOEDING 1,2 EC (1-COMPONENT VOEDING)				
1.0 ML toevoegen aan 1 liter voedingwater	laatste 2 weken van de laatste 3 weken voor de oogst					ATTENTIE: BASIS VOEDING 1,2 EC (1-COMPONENT VOEDING)				

Niet gebruiken in een systeem zonder afwatering (drainage). Gebruik nooit een zuurstofpomp in het voedingsvat of op uw kweektafel